

U.S. Food and Drug Administration

THƯỚC MEN CỦA TỚI

Office Of Women's Health and The National Association Of Chain Drug Stores

DÙNG THUỐC MỘT CÁCH THẬN TRONG

Khoảng 30%, đến 50% những người dùng thuốc đả không dùng theo sự lời chỉ dẩn. Điều này đả tạo nên việc đi khám bệnh với bác sĩ nhiều hơn, ở lại bệnh viện lâu hơn, hao hụt tiền lương và các toa thuốc thay đổi qúa nhiều. Tất cả những điều này đã làm tổn phí người Hoa Kỳ lên đến khoảng 76.6 tỷ Mỳ Kim mổi năm.

Phụ nữ thường luôn luôn lo lắng thuốc men cho cả gia đình, Cùng như cho chính bản thân họ Do đó chúng ta nên cắn đọc kỹ nhản thuốc, tránh những vấn để rắc rỗi, đặt câu hỏi và ghi chép vào sổ sách.

L DOC KÝ NHẢN THUỐC

Trước khi quí vị dùng bắt cứ thuốc gì, phải đọc kỹ nhản thuốc. Nhản thuốc sẽ cho biết:

Bản liệt kê của những chắt được kết hợp: Nếu quí vị biết là quí vị bị phản ứng với bắt kỳ chất nào trong thuốc thì đừng uống thuốc đó. Hỏi bác sĩ hoặc được sĩ của quí vị để được loại thuốc khác.

Những Lời cảnh cáo: Phải đọc thật kỹ lưỡng.

Ngày hết han: Đừng dùng thuốc sau ngày hết hạn trên nhản thuốc. Thuốc có thể không còn tác dụng.

Để được biết thêm chi tiết về thuốc men quí vị hảy hỏi được sĩ của mình.

2. TRÁNH NHƯNG VẤN ĐỀ RẮC RỐI

Thuốc men có thể gây ra nhiều vẫn để, hoặc những biến chứng; như là buổn ngũ, ói mữa, chấy máu, nhức đầu hoặc nổi mề đại. Hảy hối kỳ về những phản ứng của các loại thuốc mà quí vị đang uống. Tham khảo ý kiến của bác sĩ, được sĩ hoặc y tá của quí vị

- Hảy xếp đặt thuốc men của quí vị.
- Đừng bỏ ngang hoặc ngưng thuốc quí vị đang uống.
- Đừng xài chung hoặc cho người khác uống thuốc của quí vị.
- Đừng uống thuốc trong tối.

3. NHỮNG ĐIỀU CẦN HỎI

- •Thuốc loại gì và tên gì?
- Dùng loại thuốc thường/tương tự (Generic) được không?
- •Tại sao tôi phải uống thuốc này?
- •Phải uông thuốc vào những lúc nào?
- •Phải uống thuốc lúc đói hay chung với thức ăn?
- •Khi uống thuốc này dùng rượu có an toàn không?
- •Nếu quên uống thuốc thì phải làm những gì?
- •Độ thuốc phải uống là bao nhiều?

Liệt kệ những đi ứng của mình:

- •Phải uống thuốc trong thời gian bao lâu?
- •Có những triệu chứng gì cấn phải để ý không?

Nếu mang thai hay đang cho con bú sữa mẹ, nhớ tham khảo ý kiến chuyên viên y tế trước khi dùng bắt cứ thuốc men hay thuốc bổ sung cho vấn đề ăn uống kiêng cữ nào. Hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá cuả quí vị. Họ sẽ sắn sàng giúp đở quí vị.

Elft to many of any		
	2.612	
Bác sĩ:		
Số điện thoại:		

4. DANH SÁCH THUỐC ĐẠNG DÙNG

Đánh dấu những loại thuốc mà quý vị đang dùng:

٥	Aspirin hay các loại thuốc đau nhức/nhức đầu/ trị nóng sốt.
٥	Thuốc dị ứng
٥	Thuốc trị giảm độ axít trong dạ dày
۵	Thuốc ho
0	Thuốc bổ sung cho vấn để ăn uống kiêng cữ
0	Thuốc nhuận trường / táo bón
a	Thuốc ngủ
٥	Thuốc bổ có nhiều chất hửu cơ (Vitamins)
•	Thuốc bổ có nhiều khoáng chất (Minerals)
	Dược thảo
٥	Các loại thuốc men khác

TÉN:	
The state of the s	

LIỆT KẾ CÁC LOẠI THUỐC CÓ TOA QỦY VỊ ĐANG ĐÙNG:

Ngày	Tên Thuốc	Mổi lần phải uồng bao nhiêu ?	Khi nào phải uống thuốc?	Thuốc này dùng để trị bệnh gì?	Cần phải lấy thêm bao nhiêu lần?
	XXXXXXXX (VI DŲ)	1 viên 400 mg	3 lắn mối ngày sau khi ăn	Phong thắp	2
		1			
	A				

GI<mark>Ử BẢN LIỆT KỂ THUỐC NÀY TRONG BÓP V</mark>À CHO BÁC SĨ, ĐƯỢC SĨ, Y TÁ CỦA QUÝ VỊ XE**M**. Tài liệu này do Chương Trình Sức Khỏe Phụ Nữ (OWH) cuả Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Được Phẩm Liên Bang (FDA) cùng với Hội Đoàn Tiệm Thuốc Tây Toàn Quốc (NACDS) thực hiện. Văn phòng OWH và NACDS thành thật cám ơn tất cả các tổ chức tham gia đả giúp đở trong việc xuất bản và phân phối tài liệu này.

Sửc Khóc Của Phụ Nữc Hây Jành thời siờ để châm sóc cho chính mình và cho những ... thân nhân của Qúy Bà.





Take Time to Care Home Page | Office of Women's Health Home Page | FDA Home Page