

巴氏抹片檢查-Pap Tests

巴氏抹片檢查是什麼？

巴氏抹片檢查可以檢查子宮頸細胞的變化。子宮頸為子宮的下面部分，其開口與陰道相連接。此檢查可發現癌細胞或可能變為癌症的細胞。

婦女應何時開始接受巴氏抹片檢查？

所有的婦女都必須在第一次性交之後大約3年時開始接受巴氏抹片檢查。所有的婦女都必須在滿21歲時開始接受巴氏抹片檢查。

巴氏抹片檢查是如何進行的？

- 醫生或護士會將陰道窺管插入陰道來檢視子宮頸。
- 醫生或護士會從子宮頸內部與外部取出細胞檢體。

接受巴氏抹片檢查之前需做哪些準備？

在做巴氏抹片檢查之前大約2天之中，請勿：

- 性交
- 灌洗陰道
- 使用月經塞棉
- 使用置入陰道的避孕方法，例如避孕泡沫、避孕膏、避孕膠凍

- 使用必須置入陰道的任何藥物
- 使用陰道潤滑液
- 使用女性除臭噴劑或粉末
- 游泳
- 盆浴

若您月經來，請勿做巴氏抹片檢查，因為這樣會較難發現異常細胞。請打電話更改檢查時間。

婦女必須多久做一次巴氏抹片檢查？

婦女須與醫生或護士討論多久做一次巴氏抹片檢查。婦女須多久做一次巴氏抹片檢查必須根據許多事情來決定，包括：

- 年齡
- 過去的巴氏抹片檢查結果
- 醫療史
- 是否感染人類乳突病毒（HPV）
- 抽菸

婦女何時可以停止接受巴氏抹片檢查？

若過去十年的所有巴氏抹片檢查結果均為正常，則婦女可在70歲時停止接受巴氏抹片檢查，但所有70歲以上的婦女還是應該每年接受骨盆檢查。



結束



巴氏抹片檢查-Pap Tests

接受過子宮切除術的婦女須接受抹片檢查
嗎？

- 接受過部份子宮切除術的婦女仍須接受巴氏抹片檢查，因為此手術只切除子宮，並未切除子宮頸。
- 接受全子宮切除術的婦女可停止接受巴氏抹片檢查，因為此手術同時切除子宮與子宮頸。
- 即使在停止接受巴氏抹片檢查之後，所有的婦女還是應該每年接受骨盆檢查。

FDA婦女健康辦公室(FDA Office of Women's Health) <http://www.fda.gov/womens>

如需更多資訊：

美國食品與藥物管理局
(Food and Drug Administration , FDA)
http://www.fda.gov/fdac/features/2004/104_cancer.html

美國國家癌症研究院
(National Cancer Institute , NCI)
子宮頸癌首頁
<http://www.cancer.gov/cancerinfo/types/cervical>
電話： -800-4-CANCER 1-(800-422-6237)
TTY/TDD： 1-800-332-8615