

Hoja Informativa sobre el Cáncer Cervical

QUE HAY ADENTRO:

- ❖ ¿**Qué es** el **cáncer**?
- ❖ ¿**Qué es** el **cáncer cervical**?
- ❖ ¿Cuáles son las **causas** del cáncer cervical?
- ❖ ¿Cuáles son los **síntomas** del cáncer cervical?
- ❖ ¿Existen **pruebas** para **detectar** el cáncer cervical?
- ❖ ¿Qué pasa si los **resultados no son normales**?
- ❖ ¿Cómo se **trata** el cáncer cervical?

FUENTES:

Instituto Nacional del Cáncer

- ❖ [Información general sobre el cáncer de cuello uterino](#)
- ❖ [Lo que necesita saber sobre el cáncer de cérvix](#)

Sociedad Americana Contra el Cáncer

- ❖ [Cáncer de cuello uterino: guía detallada](#)

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

- ❖ [Cáncer del cuello uterino](#)

¿Qué es el cáncer?

- ❖ El cáncer ocurre cuando las células en el cuerpo crecen fuera de control.
- ❖ Los cánceres llevan el nombre del lugar del cuerpo donde se iniciaron.



¿Qué es el cáncer cervical?

- ❖ La cervix o cuello uterino es la parte baja del útero
- ❖ Se encuentra localizado arriba del canal vaginal
- ❖ Cuando el cáncer empieza en la cervix o cuello uterino se llama cáncer cervical
- ❖ Las células no cambian de repente y se convierten en cáncer
- ❖ Una etapa "pre cancerígena" tiene células que no son normales.
- ❖ No es cáncer pero se puede volver en cáncer si no es tratado.



¿Cuáles son las causas del cáncer cervical?

- ❖ El cáncer cervical es causado por el VPH o virus del papilomano humano
- ❖ El VPH es un virus que se pasa a través del contacto sexual
- ❖ La mayoría de los adultos tienen infecciones VPH durante alguna etapa de sus vidas.
- ❖ Usualmente la infección desaparece por sí sola.
- ❖ Hay más de 100 tipos distintos de VPH. Solo algunos causan cáncer si la infección no se ataca temprano.
- ❖ La persona que tiene un tipo de VPH que causa cáncer y no recibe tratamiento en muchos años podrían tener cáncer luego.
- ❖ Una vacuna (inyección) está disponible para prevenir la infección de VPH.



¿Cuáles son los síntomas del cáncer cervical?

- ❖ Los síntomas pueden incluir:
 - Sangrado vaginal cuando la mujer no se lo espera, por ejemplo entre periodos menstruales.
 - Periodos menstruales muy fuertes.
 - Dolor durante el acto sexual
- Flujo vaginal inusual



- ❖ Muchas otras cosas a parte del cáncer pueden causar estos síntomas. Es importante consultar con un medico si existe alguna preocupación.
- ❖ Algunas veces el cáncer cervical no causa síntomas y se encuentra a través de un examen Pap.
- ❖ El examen Pap chequea la presencia de cáncer cervical
 - Esto usualmente es parte del examen pélvico regular

¿Cómo se trata el cáncer cervical?

- ❖ Las células pre cancerígenas se remueven. Usualmente esto requiere un procedimiento corto en la oficina o clínica del medico
- ❖ El cáncer cervical se trata con cirugía, terapia de radiación o quimioterapia. Algunas veces se utiliza más de un tratamiento.
- ❖ Un ginecólogo u oncólogo (especialista en cáncer) puede ayudarle a escoger el tratamiento correcto.



¿Existen pruebas para detectar el cáncer cervical?

- ❖ Hay dos exámenes que se realizan para encontrar el cáncer cervical o las células pre cancerígenas
 - Prueba Pap – durante el examen pélvico, el médico o enfermera toma un par de células de la cérvix para examinar
 - Prueba para el VPH – un examen de sangre que busca la presencia del virus
- ❖ La infección por VPH puede causar pruebas Pap irregulares. La prueba para el VPH puede ayudar a determinar si las anomalías en la prueba Pap se deben a una infección VPH.
- ❖ Una mujer debe hacerse la primera prueba Pap a los 21 años
- ❖ Después de la primera prueba, debe hacerse una regularmente cada 1 a 3 años.
- ❖ Las mujeres mayores de 30 algunas veces reciben la prueba VPH junto con el Pap



¿Qué pasa si los resultados no son normales?

- ❖ Cuando una prueba Pap o VPH no es normal, no significa que la mujer tenga cáncer.
- ❖ Las pruebas pueden ser anormales debido a:
 - Una infección
 - Existencia de células pre cancerígenas
 - Un error del laboratorio al mirar las células del examen Pap.
- ❖ Es importante encontrar y tratar el percance



- ❖ El tratamiento puede prevenir el desarrollo del cáncer.
- ❖ Las infecciones puede ser tratadas con medicamentos.
- ❖ Un proveedor de cuidado de salud puede sugerir la re examinación o hacerse otras pruebas.
- ❖ Otras pruebas pueden incluir:
 - Colposcopia – un medico utiliza una herramienta con una luz y una lupa para mirar de cercal as células anormales de la cérvix. Si existen células anormales, puede sugerir una biopsia.
 - Biopsia- el proveedor toma un pedazo pequeño de tejido de la cérvix. Esta muestra se envía a un laboratorio para ser estudiada.

